BOURGOGNE
BASE FAUNA

Tableau des Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) prioritaires de l'Observatoire de la FAune de Bourgogne (OFAB)

		Nom français (*Nom latin*)	Description	Photo
Faune	**Mammifères**	Ragondin (*Myocastor coypus*)	✓ 70 cm (avec queue) et 6-15 kg ✓ fourrure épaisse et serrée, brun à brun jaunâtre plus ou moins foncée ✓ bout du museau, menton et vibrisses blancs ✓ face externe des incisives toujours visible et orange ✓ queue peu velue, cylindrique et écailleuse ✓ pattes postérieures palmés ✓ crotte brun foncé à vert, cylindrique avec de fines cannelures longitudinales	
		Rat musqué (*Ondatra zibethicus*)	✓ mammifère plutôt grassouillet ✓ tête légèrement allongée et membres courts ✓ fourrure d'une grande qualité, duvet parfaitement imperméable ✓ dos brun ou noirâtre et ventre teinté de gris et d'argenté ✓ pattes avant (mains avec des doigts) permettant des manipulations précises ; pattes arrière (partiellement palmées avec des doigts poilus) permettant de nager avec facilité ✓ queue écailleuse et aplatie à la verticale (servant de gouvernail grâce à ses mouvements ondulés et donnant aussi un surcroît de propulsion)	

		Raton laveur (*Procyon lotor*)	✓ taille d'un gros chat ✓ masque de « bandit » noir sur une robe grisâtre ✓ longue queue annelée (5-7 anneaux bruns ou noirs délimités par des poils plus clairs) ✓ plantigrade, doigts flexibles et capables de manipulations délicates ✓ 3-9 kg selon le sexe ✓ variations pondérales saisonnières très marquées (en hiver, perte pouvant atteindre 50 % du poids automnal chez l'adulte) ✓ crottes cylindriques, non effilées aux deux extrémités	
		Vison d'Amérique (*Mustela vison*)	✓ mustélidé de taille modeste ✓ corps brun luisant, allongé et cylindrique ✓ tête légèrement aplatie et museau court et large ✓ oreilles ne dépassant que faiblement de la fourrure ✓ membres courts avec des doigts reliés par une palmure ✓ excréments souvent cylindriques, généralement déposés sur des sites bien en évidence, contenant souvent des restes de poissons	
		Chien viverrin (*Nyctereutes procyonoides*)	✓ petit chien massif et trapu ✓ pattes, oreilles et queue courtes ✓ masque facial sombre ✓ pelage de couleur fauve à gris, excepté les pattes et la queue qui sont de teinte dominante noire ✓ poids : 4-6 kg en été et 6-10 kg en hiver	

	Oiseaux	Bernache du Canada (*Branta canadensis*)	✓ cou, bec et tête entièrement noirs ✓ joues et gorge blanches ✓ queue noire, croupion et bas-ventre blancs ✓ reste du corps brun-gris avec des liserés plus clairs	
		Ibis sacré (*Threskiornis aethiopicus*)	✓ taille moyenne et aspect robuste ✓ plumage du corps blanc mais tête et cou noirs et dénudés ✓ bout des ailes et bas du dos également noirs ✓ bec très caractéristique, épais et recourbé ✓ sexes semblables ✓ en vol, dessous des ailes présente une teinte blanche mais avec une bande brune sur les couvertures inférieures	
	Amphibiens	Grenouille taureau (*Lithobates catesbeianus*)	✓ adultes, d'une longueur moyenne (museau-cloaque) de 20 cm et pèsent plusieurs centaines de grammes (environ 10 fois plus que ✓ les plus grosses grenouilles vertes (Rana esculenta) autochtones) ✓ dos vert olive à brun foncé avec souvent des tâches plus sombres ✓ abdomen couleur crème moucheté de gris ✓ dimorphisme sexuel (tympan notamment) ✓ absence de repli dorso-latéral, repli cutané uniquement autour du tympan	

	Reptiles	Tortue de Floride (*Trachemys scripta*)	✓ tortue d'eau douce ✓ 20-60 cm ✓ importantes tâches jaunes à rouges sur chaque côté de la tête ✓ carapace et peau de couleur olive à marron avec des points et des stries jaunes ✓ mâles généralement plus petits que femelles	
	Poissons	Silure glane (*Silurus glanis*)	✓ 30-40 kg et 150 cm (peut dépasser 500 cm et peut atteindre 300 kg) ✓ corps allongé, large et trapu dans sa partie antérieure, aminci et comprimé latéralement dans sa partie postérieure ✓ tête, forte et large, aplatie dorso-ventralement avec une bouche largement ouverte est munie de 6 barbillons ✓ 2 nageoires pectorales munies d'un dard, 1 seule nageoire dorsale courte et sans épine et 1 nageoire anale très longue à peine séparée de la caudale, petite et arrondie, munie d'un aiguillon ✓ peau nue et visqueuse (recouverte d'un abondant mucus)	
		Poisson-chat commun (*Ameiurus melas*)	✓ corps assez massif, cylindrique dans sa partie antérieure et comprimé latéralement dans sa partie postérieure ✓ large bouche entourée de 8 barbillons bien développés ✓ dos et flancs noirâtres à brunâtres ✓ ventre jaunâtre à blanchâtre ✓ absence d'écailles ✓ nageoires pectorales et dorsale précédées d'un aiguillon acéré et légèrement dentelé (celui de la nageoire dorsale est venimeux)	

		Carpe argentée (*Hypophthalmichthys molitrix*)	✓ corps massif et allongé, comprimé latéralement ✓ tête large, massive et pointue, avec une fente buccale verticale ✓ possède un très grand opercule qui recouvre les arcs branchiaux ✓ petits yeux, dirigés vers le bas et situés au-dessous de la ligne médiane ✓ nageoire caudale très échancrée ✓ écailles fines sur tout son corps, menues et élancées ✓ dos, plutôt sombre, gris-vert mais face ventrale et flancs gris argenté ✓ mesure 40-60 cm (jusqu'à 1 m) et pèse 6 kg en moyenne (jusqu'à 40-50 kg)	
		Perche-soleil (*Lepomis gibbosus*)	✓ forme discoïdale, corps comprimé latéralement ✓ bouche petite et oblique ✓ ne possède qu'une seule nageoire dorsale longue avec une partie antérieure à rayons épineux et une partie postérieure à rayons mous ✓ nageoires caudale peu fourchue et pectorales longues et pointues ✓ possède des couleurs vives : dos vert-olive, flancs plus clairs avec des points rouges ou orangés et des reflets dorés et irisés, ventre orange ✓ tâche vivement colorée, rouge écarlate, sur le bord postérieur de l'opercule des mâles	
		Ide mélanote (*Leuciscus idus*)	✓ corps allongé, légèrement bombé ✓ corps vert-foncé avec des flancs plus clairs et argentés et un ventre blanc ✓ nageoires pectorales, pelviennes, et anale rosées à rouges ✓ bouche étroite ✓ petites écailles (55-63 le long de la ligne latérale) ✓ 40-50 cm pour 2 kg en moyenne	

		Black-bass à grande bouche (*Micropterus salmoides*)	✓ corps haut et aplati latéralement, aspect général plutôt trapu ✓ tête forte (> 1/3 de la longueur totale) avec une gueule énorme ✓ opercule, à bord lisse, terminée par une pointe dirigée vers l'arrière et barrée de 2 bandes ✓ nageoire dorsale en deux parties, séparées par une nette échancrure ✓ dos vert bronzé sombre, flancs vert-olive avec des reflets argentés et ventre blanc-jaune (certain mimétisme avec la végétation aquatique) ✓ nageoires gris-verdâtre et iris de l'œil jaune-orangé ✓ mesure 40-60 cm et pèse jusqu'à 3 kg	
		Pseudorasbora (*Pseudorasbora parva*)	✓ corps allongé et cylindrique ✓ bouche dirigée vers le haut ✓ de couleur gris-argenté ✓ raie noire partant de la bouche jusqu'à la caudale ✓ 10-11 cm	
		Crapet de roche (*Ambloplites rupestris*)	✓ corps élevé et comprimé latéralement ✓ peut atteindre à l'âge adulte une taille de 30 cm ✓ de couleur brun olive et tacheté de point plus sombres ✓ 5-7 épines qui précédent la nageoire anale ✓ grands yeux de teinte rouge orangé	

		Aspe (*Leuciscus aspius*)	✓ corps allongé, légèrement comprimé latéralement ✓ 50 à 75 cm en moyenne ✓ bouche assez grande et orienté vers le haut, avec la mâchoire inférieure un peu plus longue que la supérieure ✓ profil de prédateur ✓ dos gris-vert, flancs avec des reflets jaunes et ventre blanc ✓ nageoires grises à brunes et parfois à peine rougeâtres	
	Mollusques	Moule zébrée (*Dreissena polymorpha polymorpha*)	✓ mollusque bivalve, coquille triangulaire ✓ petite taille, 0,5-5 cm ✓ les sexes sont séparés ✓ brun foncé, uni ou présentant une ou plusieurs stries beiges ou blanches, ainsi qu'une charnière non dentée ✓ plusieurs formes : les stries sur les valves peuvent être absentes ou nombreuses, en zigzag, radiaires ou arquées	
		Corbicule asiatique (*Corbicula fluminea*)	✓ présente un polymorphisme et un polychromatisme selon sa distribution sur le réseau hydrographique ✓ individus rencontrés possèdent un périostracum de couleur brune et une nacre à reflets pourpres	

		Hydrobie des antipodes (*Potamopyrgus antipodarum*)	✓ coquille conique haute et fermée par un opercule corné à ornementations spiralées ✓ coquille opaque de teinte brunâtre, soit lisse soit avec une crête médiane sur les spires, portant ou non des épines ✓ 6-7 tours de spires ✓ taille maximales de 5 mm	
	Crustacés	Écrevisse américaine (*Orconectes limosus*)	✓ ornementations brunâtres sur la face dorsale de l'abdomen ✓ présente les caractéristiques de la famille des Cambaridae : notamment un ergot sur le côté interne de l'article précédant les grandes pinces et un éperon chez les mâles placé à la base des pattes marcheuses III. La femelle présente un réceptacle séminal appelé annulus ventralis ✓ taille habituelle aux alentours de 70-80 mm (jusqu'à 120-140 mm) ✓ carapace rigide interdisant toute croissance, l'écrevisse doit s'en extraire pour grandir pendant la mue	
		Écrevisse de Californie (*Pacifastacus leniusculus*)	✓ céphalothorax lisse, contrairement aux autres espèces décrites ✓ pinces massives, lisses et décorées d'une tache claire, parfois bleutée, située à la commissure du doigt fixe et du doigt mobile ✓ peut atteindre une taille importante : longueur totale de 140 mm (pour un poids de 150 g)	

		Écrevisse de Louisiane (*Procambarus clarkii*)	✓ céphalothorax rugueux, hérissé de nombreux petits tubercules ✓ rostre en gouttière et avec des bords convergeant régulièrement pour former un triangle caractéristique ✓ ergot sur la face interne de l'article précédant les grandes pinces ✓ éperon sur les 3ièmes et 4ièmes pattes marcheuses chez les mâles, ✓ réceptacle séminal chez les femelles ✓ longueur totale : 105-118 mm (35-56 g) ✓ coloration généralement rouge vineux (peut avoir une couleur grise à bleu)	
		Gammare poilu (*Dikerogammarus villosus*)	✓ mesure jusqu'à 31 mm ✓ nettement plus grand que les gammares de type *pulex* ✓ caractérisé par un polymorphisme de pigmentation ✓ possède 2 petites épines dorsales sur les derniers segments de la carapace	
		Aselle (Asellus aquaticus)	✓ crustacé aplatie qui marche sur le fond ✓ forme évoquant celle d'un cloporte ✓ porte 2 longues antennes mobiles et 7 paires de pattes ✓ mesure 8-15 mm mais croît toute sa vie ✓ grisé, très légèrement translucide ✓ yeux primitifs et affleurant sur la carapace chitineuse de la tête	

	Insectes	Frelon asiatique (*Vespa velutina nigrithorax*)	✓ seule guêpe en Europe à posséder une livrée aussi foncée ✓ possède un thorax entièrement brun noir velouté et des segments abdominaux bruns, bordés d'une fine bande jaune ✓ seul le 4ème segment de l'abdomen est presque entièrement jaune orangé ✓ tête noire, face jaune orangé, pattes brunes à l'extrémité ✓ mesure environ 3 cm de long	
		Coccinelle asiatique (*Harmonia axyridis*)	✓ détermination malheureusement non évidente à cause de sa très grande variabilité de couleurs ✓ plus grande que la plupart des espèces indigènes : 5-8 mm ✓ 3 types dessins sur le pronotum : clair avec un dessin en forme de « M », clair avec « patte de chat » (1 tache centrale avec 4 autres taches en demi-cercle autour) sans taches supplémentaires et noir avec deux larges bandes claires	
		Chrysomèle du maïs (*Diabrotica virgifera*)	✓ mesure 5-6 mm ✓ présente des élytres jaune vif ornés de 2 lignes noires longitudinales ✓ reconnaissable aux longues antennes implantées l'une près de l'autre sur le front	

		Brun du pélargonium (*Cacyreus marshalli*)	✓ envergure de 15-23 mm pour le mâle et 18-27 mm pour la femelle ✓ ressemble (pour le dessin du dessous des ailes et les 2 petites queues à *Lampides boeticus* et *Leptotes pirithous* ✓ ailes brunes dessus et beige clair marquées de stries dessous	
		Punaise du pin (*Leptoglossus occidentalis*)	✓ de couleur brun-rouge ✓ antennes composées de 4 articles ✓ mesure 1,5-2 mm ✓ chaque aile antérieure présente une fine ligne blanche en zigzag ✓ face supérieure de l'abdomen jaune orangée avec 5 tâches sombres transversales ✓ fémurs des pattes postérieures souvent dilatés avec des épines et tibias présentant une dilatation en forme de feuille	
		Capricorne asiatique (*Anaplophora chinensis* et *Anaplophora glabripennis*)	✓ adulte noir brillant ✓ 2-3,5 cm de long et 0,7-1,2 cm de large ✓ femelles généralement plus grosses que mâles ✓ élytre porte une vingtaine de taches blanches pour *A. chinensis*, un peu moins pour *A. glabripennis* ✓ antennes très longues ; égales à la taille du corps pour la femelle et environ deux fois la taille du corps pour les mâles ✓ segment antennaire noir avec une base bleu-gris ✓ au niveau de la partie supérieure des élytres, *A. chinensis* présente une granulation alors que *A. glabripennis* n'en a pas	

		Carabe splendide (*Carabus splendens*)	✓ très beau carabe svelte et allongé ✓ 24 à 35 mm ✓ dessus vert doré très brillant, plus rarement pourpré ✓ antennes et pattes noires ✓ 7ème et 8ème articles des antennes du mâle sont déprimés par-dessous ✓ pronotum étroit et allongé ✓ élytres allongés, renflés vers l'arrière	
	Bryozoaires	Pectinatelle (*Pectinatella magnifica*)	✓ colonie formant une grosse masse brune informe arrondie ou en boudin flottant entre deux eaux ✓ peut former des ensembles spectaculaires longs de plusieurs mètres ✓ surface ornée de grumeaux, de petits creux et de bosses, correspondant aux individus de la colonie	
Flore		Jussie à grandes fleurs (*Ludwigia grandiflora*)	✓ plante herbacée aquatique vivace, enracinée sous l'eau ✓ tiges de 5-10 mm de diamètre peuvent atteindre à l'horizontale une longueur de 6 m et s'élèvent verticalement 40-80 cm au-dessus de l'eau ✓ feuilles légèrement poilues, alternes et lancéolées ✓ fleurs solitaires, brièvement pédonculées, à l'aisselle des feuilles supérieures, ont 5 pétales jaunes et un diamètre de 2-5 cm ✓ fruits en forme de capsules allongées renferment de nombreuses graines	

	Ambroisie à feuilles d'Armoise (*Ambrosia artemisiifolia L.*)	✓ dicotylédone annuelle printanière ✓ feuilles très découpées (jusqu'à la nervure centrale) vert clair dessus et dessous ✓ tige dressée, poilue, parfois rouge ✓ peut devenir tapissante après fauche ✓ hauteur de 20-80 cm ✓ inflorescences terminales allongées en épi ✓ fleurs très petites vertes et jaunes	
	Renouée du Japon (*Reynoutria japonica*)	✓ plante vivace rhizomateuse à port buissonnant ✓ hauteur comprise entre 1-2,5 m (voire 4m) ✓ formant de vastes massifs denses ✓ fleurs blanc verdâtre, disposées de manière spiralée	
	Robinier faux-acacia (*Robinia pseudoacacia L.*)	✓ arbres à feuilles caduques ✓ peut atteindre 30 m de haut ✓ écorce profondément crevassée et de couleur gris-brun ✓ rameaux épineux, feuilles imparipennées, folioles entières, de 2-5 cm de long ✓ stipules transformées en aiguillons robustes ✓ fleurs blanches, en grappes lâches et pendantes de 10-20 cm de long ✓ fruits sous forme de gousses sèches, longues de 4-10 cm, contenant des graines rondes	

	Balsamine de l'Himalaya (*Impatiens glandulifera*)	✓ grande plante vigoureuse et glabre ✓ feuilles opposées ou en verticille, nettement dentées ✓ fleurs roses, rouges ou pourpres en grappes lâches, odorantes, à éperon court ✓ graines contenues dans des capsules allongées qui éclatent à maturité par détente de la tige capsulaire	
	Raisin d'Amérique (*Phytolacca americana*)	✓ vivace ✓ tiges dressées de couleur rouge ✓ grappes de fleurs blanches aux extrémités des branches pendant la période estivale, ensuite des baies noires toxiques	